· 基础研究 ·

人参水煎煮的科学性探索—— 水煎煮引发人参皂苷化学结构的转化[△]

杨秀伟*, 张雷

北京大学药学院天然药物学系/天然药物及仿生药物国家重点实验室, 北京 100191

[摘要] 目的: 研究人参在水煎煮过程中人参皂苷化学结构的转化。方法: 在室温条件下用水超声提取人参和回流提取人参, 分别得到两种提取物。然后, 通过 UFLC-MS/MS 和与对照品比较分析及鉴定人参皂苷, 比较两个提取物人参皂苷的差别。结果: 热水回流提取人参, 可以得到多种稀有人参皂苷。结论: 通过煎煮转化, 极性人参皂苷可产生稀有人参皂苷。

[关键词] 人参; 人参皂苷; 水煎煮转化; 极性人参皂苷; 稀有人参皂苷

[中图分类号] R282.71; R284.1 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-4890(2019)08-1009-07

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20181224007

Scientific Exploration on Decoction of Ginseng by Water:

Decoction Leading to Transformation of Chemical Structure of Ginsenosides

YANG Xiu-Wei*, ZHANG Lei

State Key Laboratory of Natural and Biomimetic Drugs, Department of Natural Medicines,
School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Beijing 100191, China

[Abstract] **Objective:** To study the chemical structure transformation of ginsenosides in ginseng during water decoction. **Methods:** Ginseng was extracted in water by ultrasonic at room temperature and refluxed in water by heat to give both extracts, respectively. Then, ginsenosides were analysed and identified by ultra-fast liquid chromatography coupled with MS/MS method and comparison with standard substances to compare the ginsenoside difference between the two extracts. **Results:** A variety of rare ginsenosides can be obtained by extracting ginseng on the water decoction. **Conclusion:** Rare ginsenosides were produced from polar ginsenosides by water decoction-transformation.

[Keywords] Ginseng; ginsenoside; water decoction-transformation; polar ginsenoside; rare ginsenoside

传统中药人参(*Ginseng Radix et Rhizoma*)系五加科多年生草本植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根和根茎, 驰名中外, 获誉“百草之王”。早在远古皇帝时代, 有关人参的神奇功效就已为人所知, 人参已有 4000 多年的应用历史; 为了满足需要, 西晋末年, 已经开始栽培人参, 距今已有 1600 多年的历史。有关人参的记载, 见于春秋时期越国宰相范蠡著《范子计然》一书, 书中有“人参出上党, 状类人形者善”的描述。我国最早的药学典籍《神农本草经》记载“人参味甘, 主补五脏、安精神、定魂魄、止惊悸、除邪气、明目、开心、益智,

久服轻身延年”。东汉时期名医张仲景所著《伤寒论》一书中共有 113 个成方, 其中含有人参的配方达 21 个, 并论述人参具有“温补、滋润、强壮、强精、保温、增强视力、安定精神”等作用。从古至今, 人参或以“独参汤”形式药物应用, 或以“配方”形式药物应用, 民间作为补品煲汤饮用。自 1963 年科学家从人参中分离鉴定出人参皂苷(ginsenoside, G)^[1-2]以来, 现代科学研究已充分证明, 人参皂苷几乎反映了人参的全部药理学作用。由于人参为水煎剂形式用药, 本文探讨人参水煎煮的科学性——水煎煮引发人参皂苷化学结构的转化。

[△] [基金项目] 国家自然科学基金重点项目(81530097)

* [通信作者] 杨秀伟, 教授, 博士生导师, 研究方向: 天然产物化学与药物代谢; Tel: (010)82801569, E-mail: xwyang@bjmu.edu.cn

1 仪器与材料

1.1 仪器

岛津 LCMS-8050 超高效液相色谱-质谱联用仪, 包括 Nexera X2 UFLC 液相系统: LC-30AD 二元泵、SIL-30AC 自动进样器、SPD-M30A 检测器、CTO-20AC 柱温箱; 8050 型三重四级杆定量质谱: 配备 ESI 离子源和 LabSolution 工作站; Mettler XS105DU 十万分之一电子天平 (METTLER TOLEDO, Zurich, Switzerland); AR4120 型万分之一电子天平 [奥豪斯国际贸易(上海)有限公司]; KQ5200 超声波清洗仪(昆山市超声仪器有限公司, 功率: 200 W, 频率: 40 kHz)。

1.2 材料

人参饮片(批号: PG-Y-201606)购自河北安国药材市场, 经本文作者之一杨秀伟教授鉴定为 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根和根茎。

对照品人参皂苷 G-Re(1)、G-Rb₁(2)、20(S)-G-Rh₁(3)、20(S)-G-Rg₂(4)、20(R)-G-Rg₂(5)、G-Rc(6)、20(R)-G-Rh₁(7)、G-Rb₂(8)、G-Rb₃(9)、G-Rd(10)、G-Rg₆(11)、G-F₄(12)、G-Rk₃(13)、G-Rh₄(14)、20(S)-G-Rg₃(15)、20(R)-G-Rg₃(16)、20(S)-PPT(17)、20(R)-PPT(18)、G-Rk₁(19)、G-Rg₅(20)、20(S)-G-Rh₂(21)、20(R)-G-Rh₂(22)、20(S)-PPD(23)、20(R)-PPD(24), 系本课题组从生晒参^[3]、红参^[4]、人参茎叶^[5]或人参茎叶总皂苷酸水水解产物^[6]中分离制备, 纯度经 LC-MS 验证均大于 98%。以上 24 个对照品的结构式见图 3~4。

LC-MS 级别乙腈和甲醇购自 Fisher Scientific Inc. (Pittsburgh, PA, USA); 色谱纯级别乙腈、甲醇为天津西华特种试剂厂产品; 超纯水 (18 MΩ·cm⁻¹) 为本实验室用 Milli-Q Advantage A10 (Millipore, Billerica, USA) 制水机自制; HPLC 级别醋酸铵购自 Sigma-Aldrich (Lot # BCBK6717V, Sigma-Aldrich, Co., MO, USA)。

2 实验条件和方法

2.1 实验条件

液质分析 C₁₈ 色谱柱为 Waters ACQUITY UPLC[®] BEH Shield RP₁₈ (100 mm × 2.1 mm, 1.7 μm, Part# 186002854, Ser # 01603514816023, Made in Ireland); 配有相同填料预柱 Waters ACQUITY UPLC[®] BEH Shield RP₁₈ VanGuardTM Pre-Column (5 mm ×

2.1 mm, 1.7 μm, Part#186003977, Lot#0158351601, Made in Ireland)。流动相为 0.5 mmol·L⁻¹ 醋酸铵水溶液(流动相 A)和乙腈(流动相 B)。采用梯度洗脱方式, 梯度洗脱程序: 0~3 min, 20%~22% B; 3~5 min, 22%~30% B; 5~9 min, 30%~33% B; 9~11 min, 33%~35% B; 11~13 min, 35%~42% B; 13~23 min, 42%~47% B; 23~24 min, 47%~52% B; 24~29 min, 52%~55% B; 29~29.1 min, 55%~60% B; 29.1~34 min, 60%~65% B; 34~36 min, 65%~95% B。流速设为 0.4 mL·min⁻¹, 柱温控制在 30 °C, 进样体积为 1 μL。

质谱参数优化结果如下: 雾化气流速: 3 L·min⁻¹; 干燥气流速: 10 L·min⁻¹; 加热气流速: 10 L·min⁻¹; 接口加热器温度: 300 °C; 脱溶剂管温度: 250 °C; 接口电压: -3.0 kV; 检测器电压: 1.80 kV。电离源为电喷雾离子源, 扫描方式为多反应监测, 扫描模式为负离子模式。

2.2 混合对照品溶液的配制

精密称取各对照品适量, 溶解于质谱级别甲醇中, 制成质量浓度为 1.0 mg·mL⁻¹ 的对照品储备液, 分别移取适量储备液混合并稀释制成混合对照品母液。连续稀释混合对照品母液得到一系列混合对照品线性工作液。

2.3 分析样品的制备

2.3.1 水超声提取 人参饮片粉碎过 40 目筛, 准确称取 1 g 加入 40 mL 水, 常温下超声提取两次, 每次 1 h, 过滤, 即得 25 mg·mL⁻¹ (以生药计) 样品溶液。再次用水稀释至 0.5 mg·mL⁻¹ (以生药计), 平行制备两份样品。

2.3.2 水回流提取 称取人参饮片 5 g, 加入 275 mL 蒸馏水, 水回流提取 2 h, 过滤。滤渣再次加入 275 mL 蒸馏水回流 2 h, 过滤后合并两次滤液, 水浴蒸至约 50 mL, 加入 100 mL 乙醇使醇浓度约为 65%, 4 °C 静置过夜, 在 3000 r·min⁻¹ 离心 10 min, 收集上清。上清减压浓缩除去乙醇后冷冻干燥, 称质量, 密封保存。分析前分别称取适量提取物溶解于甲醇制成 25、0.5 mg·mL⁻¹ (以生药计) 的样品溶液, 平行制备两份样品。

3 结果与讨论

在本课题组前期^[7]对人参皂苷 UFLC-MS/MS 研究的基础上, 本研究发现, 所有分析物均在负离子模式下有最大的响应。各分析物优化得到的保留时间、离子对信息、Q1 能量、碰撞能量、Q3 能量和滞留时间信息见表 1。

表1 24个分析物保留时间及最优离子化参数

分析物	t_R /min	MRM 转换(m/z)	滞留时间/msec	Q1 能量/V	碰撞能量/V	Q3 能量/V
1	5.64	945.5→637.4	80	20	40	32
2	9.95	1 107.6→945.5	35	10	46	34
3	10.35	637.4→475.3	38	19	24	33
4	10.35	783.5→475.4	38	10	39	32
5	10.66	783.5→475.4	38	10	39	32
6	10.74	1 077.6→945.5	38	10	45	34
7	10.81	637.4→475.3	38	19	24	33
8	11.40	1 077.6→783.5	47	32	47	40
9	11.70	1 077.6→783.5	47	32	47	40
10	12.77	945.6→783.4	80	5	38	39
11	14.71	825.4→765.4	58	19	22	37
12	15.13	825.4→765.4	58	19	22	37
13	15.15	679.4→619.4	58	25	19	31
14	15.62	679.4→619.4	58	25	19	31
15	17.49	783.4→621.3	58	24	32	30
16	17.90	783.4→621.3	58	24	32	30
17	19.15	475.4→391.3	163	10	30	43
18	19.56	475.4→391.3	163	10	30	43
19	23.57	765.5→603.4	122	23	30	29
20	24.22	765.5→603.4	122	23	30	29
21	24.50	621.4→459.3	163	24	25	32
22	24.77	621.4→459.3	163	24	25	32
23	34.30	459.4→375.3	497	5	30	41
24	34.63	459.4→375.3	497	5	30	41

分别对分析方法的专属性、系统适用性、线性、定量下限和检测下限、重复性、提取回收率和稳定性进行了方法学考察,结果表明,该方法能够用于上述24个分析物的含量测定^[8]。(数据略)。

图1为水超声法提取人参饮片得到的MRM叠加图,图2为水回流提取人参饮片得到的MRM叠加图,根据建立的UFLC-MS/MS对两种提取物的定量分析结果总结见表2。

图1 水超声提取样品中24个分析物的MRM叠加图

图2 水回流提取样品中24个分析物的MRM叠加图

常规上,如果将中药粉末置于水中在常温下提取,获得的基本上是天然的原形化合物;而热水回流提取可能得到人工产物。一般来说,人参中的原人参二醇型(protoanaxadiol, PPD)达玛烷四环三萜在C-3或C-20结合糖链,天然者的手性C-20呈S型;原人参三醇型(protoanaxatriol, PPT)达玛烷四环三萜在C-6或C-20结合糖链,天然者的手性C-20呈S型。表2定量分析结果表明,室温下超声提取,

表2 不同提取方法人参提取物中人参皂苷的含量

mg·g⁻¹

No.	分析物	质量分数		No.	分析物	质量分数	
		水超声	水回流			水超声	水回流
1	G-Re	1.540 0	1.54	13	G-Rk ₃	—	0.029
2	G-Rb ₁	0.570 0	2.58	14	G-Rh ₄	—	0.53
3	20(S)-G-Rh ₁	0.006 9	0.16	15	20(S)-G-Rg ₃	—	0.35
4	20(S)-G-Rg ₂	0.035 0	0.14	16	20(R)-G-Rg ₃	—	0.24
5	20(R)-G-Rg ₂	—	0.036	17	20(S)-PPT	—	0.001 4
6	G-Rc	0.220 0	2.29	18	20(R)-PPT	—	0.001 2
7	20(R)-G-Rh ₁	—	0.12	19	G-Rk ₁	—	0.22
8	G-Rb ₂	0.240 0	1.74	20	G-Rg ₅	—	1.47
9	G-Rb ₃	0.012 0	0.10	21	20(S)-G-Rh ₂	—	0.001 0
10	G-Rd	0.008 5	0.53	22	20(R)-G-Rh ₂	—	0.000 094
11	G-Rg ₆	—	0.10	23	20(S)-PPD	—	0.001 4
12	G-F ₄	—	0.36	24	20(R)-PPD	—	0.002 4

注：—表示未检测到。

人参饮片中化合物3 [20(S)-G-Rh₁]、4 [20(S)-G-Rg₂]等收率较低,但热回流的情况下其收率上扬。同时也可以观察到,人参饮片中不含有它们的C-20差向异构体(epimer),即化合物5 [20(R)-G-Rg₂]和7 [20(R)-G-Rh₁],但在热回流的情况下出现了化合物5和7,此已被许多研究所证实,即在人参加热提取或煎煮处理中,天然的20(S)型PPD和/或PPT达玛烷四环三萜易向20(R)型差向异构体转化,这种转化的结果不仅表现在它们溶解度上的改变,而且对其生物活性具有很大影响^[2],如表3所示的某些达玛烷四环三萜对肿瘤细胞的细胞毒活性。

表3 某些达玛烷四环三萜对肿瘤细胞的细胞毒活性
μmol·L⁻¹

化合物	IC ₅₀			
	L1210	P388	A549	Me180
20(S)-G-Rg ₃	47	58	>100	>100
20(R)-G-Rg ₃	>100	>100	>100	>100
20(S)-G-Rh ₂	22	33	31	28
20(R)-G-Rh ₂	>100	>100	>100	>100
20(S)-PPD	18	33	28	28
20(R)-PPD	>100	>100	>100	>100

表2结果显示,化合物5、7、11~24不存在于人参饮片中,但在热回流处理人参饮片的情况下,这些化合物出现了。化合物1(G-Re)、2(G-Rb₁)、6(G-Rc)、8(G-Rb₂)、9(G-Rb₃)和10(G-Rd)是生晒参中普通化合物^[1,9-10],除G-Rd外,它们应该是人参中的天然化合物,G-Rd很可能是天然人参皂苷生物合成的中间体或降解产物,有待研究证实。根据表2的检测结果和化合物的化学结构特性,推测PPD型人参皂苷可能通过热致活化水提供的能量促进糖苷键断裂,发生非酶促反应,产生一系列降解产物,见图3。G-Rb₁、G-Rb₂、G-Rb₃、G-Rc等作为起始物逐级降解,产生结构多样性的降解产物。

从表2结果也可看出,随着煎煮,G-Rb₁、G-Rb₂、G-Rb₃、G-Rc等的收量也在提高,可能来源于G-Ra₁、G-Ra₂、G-Ra₃、G-Rs₁、G-Rs₂、G-Rs₃^[1],丙二酰基人参皂苷(malonylginsenoside, MG)Rb₁、Rb₂、Rc等。作为PPT型人参皂苷可能通过热致活化水提供的能量促进糖苷键断裂,发生非酶促反应,产生一系列降解产物,见图4。典型的降解反应,如从G-Re开始等,产生少糖基的稀有人参皂苷(rare ginsenoside)。

图3 水煎煮所致 PPD 型人参皂苷的可能降解途径

图4 煎煮所致 PPT 型人参皂苷的可能降解途径

4 讨论

人参中的G-Rb₁、Rb₂、Rb₃、Rc、Re、Rg₁等称之为普通人参皂苷,存在于生晒参中。而目前将它们降解、少糖基产物称之为稀有人参皂苷,如G-Rg₅、Rh₁、Rh₂、Rh₃、Rh₄、Rk₁、Rk₂、Rk₃等。由于稀有人参皂苷较普通人参皂苷的糖基少,脂溶性相对增强,相对易于渗透组织器官或细胞,容易到达“靶点”发挥作用。在SIRT1(silent information regulator two homologue 1)模型研究中,以G-Rb₁为例,在10、20 μmol·L⁻¹对SIRT1活性无激活作用,而其降解产物稀有人参皂苷20(S)-G-Rg₃、20(R)-G-Rg₃、G-Rg₅^[11]以及20(S)-PPD和20(R)-PPD^[12]具有较强的SIRT1激活作用;在PPT型皂苷中,以G-Re为例,在10、20 μmol·L⁻¹对SIRT1活性无激活作用,而其降解产物稀有人参皂苷G-F₄、G-Rh₄^[11]以及20(S)-PPT和20(R)-PPT^[12]具有较强的SIRT1激活作用,且有不同的药代动力学行为^[13-15],无论是PPD型还是PPT型人参皂苷,总体趋势是糖基越少SIRT1激活活性越强。现代研究表明,SIRT1尤其是SIRT3与线粒体的能量代谢密切相关,此与人参传统功效的“大补元气”一致,提示其可能是人参延缓衰老的作用物质。普通人参皂苷向稀有人参皂苷的转化,改变了普通人参皂苷的活性^[16]。如在临床上,更善于用红参治疗癌症。人参经过煎煮,G-Rg₃含量大幅上升,G-Rg₃已应用于临床治疗癌症。

稀有人参皂苷的作用也是多方面的,但近年在癌症、心脑血管疾病、肺纤维化疾病以及延缓衰老等方面的研究相对较多^[2,17-21],有了相关的抗癌产品。构效关系研究^[22-23]表明,某些稀有人参皂苷的抗癌细胞增殖大致有如下趋势:G-Rk₂ ≈ G-Rh₃ > G-Rh₂ > G-Rk₁ ≈ G-Rg₅ > G-Rg₃ > G-Rh₁,而Δ^{20,21}PPD ≈ Δ^{20,22}PPD > Δ^{20,21}PPT ≈ Δ^{20,22}PPT。有关不同稀有人参皂苷抗不同癌细胞增殖,资料公布的上海药明康德合同研究组织(Contract Research Organization; CRO)测试结果见表4,具有一定的先导性。对人参地上部分化学物质的研究^[12,22,24-27]提示含有更丰富的稀有人参皂苷。

人参方药热水煎煮,由水分子提供的活化能使人参皂苷化学结构发生变化,产生的稀有人参皂苷化学结构多样性更丰富,体现了人参生物活性的多

样性。从对红参化学成分的研究^[4,7,21],也佐证了人参水煎煮的科学内涵,而与用70%乙醇水溶液提取具有明显的区别^[28]。

表4 上海药明康德CRO测试的某些稀有人参皂苷的细胞毒活性结果

细胞系	细胞类别	IC ₅₀ μmol·L ⁻¹			
		G-Rg ₃	G-Rh ₂	G-Rg ₅	G-Rk ₂
A549	肺癌	>200	69.2	65.4	34.7
HCT-8	结直肠腺癌	>200	68.7	44.0	17.4
Hep3B	肝癌	>200	73.6	57.4	22.3
HepG2	肝癌	>200	75.2	97.8	47.3
HL-60	急性早幼粒细胞白血病	>200	64.8	92.3	46.1
HUVEC	人脐静脉内皮细胞	99.4	31.2	24.8	20.3
KG-1	急性骨髓性白血病	>200	153.6	142.3	80.2
PANC-1	胰腺癌	>200	66.8	85.2	30.8
PC-3	前列腺癌	>200	93.9	80.4	46.1
Caco-2	结肠直肠癌	>150	132.4	92.2	46.2
A375	黑色素瘤	>150	60.4	93.9	50.1
Jurkat	T细胞白血病	>150	63.8	104.2	53.9
MDA-MB-231	乳腺癌	>150	58.7	73.1	34.4
K562	慢性髓细胞性白血病	>150	59.7	72.7	42.9
HT1080	纤维肉瘤	>150	53.5	27.5	25.7
MCF-7	乳腺癌	>150	75.6	75.8	51.6
LL/2	肺癌(小鼠)	>150	65.3	61.1	42.8
SK-OV-3	卵巢癌	>150	75.8	80.6	49.6
Raji	伯基特氏淋巴瘤	>150	61.5	47.1	33.6
NCI-H460	肺癌(大细胞型)	>150	60.5	90	33.2
OVCAR-3	卵巢癌	>150	58.6	77	36.4
SK-HEP-1	肝癌	>150	59.3	15.7	10.1
MKN-45	胃癌	>150	63.6	65.7	26.7

参考文献

- [1] 杨秀伟. 人参中三萜类化学成分的研究[J]. 中国现代中药, 2016, 18(1): 7-15, 55.
- [2] 杨秀伟, 富力. 人参中三萜类化学成分的生物学活性和药理学作用[J]. 中国现代中药, 2016, 18(1): 36-55.
- [3] 王洪平, 杨鑫宝, 杨秀伟, 等. 吉林人参根和根茎的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(17): 2807-2817.
- [4] 周琪乐, 徐菟, 杨秀伟. 中国红参化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2016, 41(2): 233-249.
- [5] 杨秀伟, 李珂珂, 周琪乐. 人参茎叶中1个新皂苷20(S)-人参皂苷Rf₂[J]. 中草药, 2015, 46(21): 3137-3145.
- [6] 马丽媛, 杨秀伟. 人参茎叶总皂苷酸水解产物化学成分

- 研究[J]. 中草药, 2015, 46(17): 2522-2533.
- [7] ZHOU Q L, ZHU D N, YANG X W, et al. Development and validation of an UFLC-MS/MS method for simultaneous quantification of sixty-six saponins and their six aglycones: Application to comparative analysis of red ginseng and white ginseng[J]. J Pharm Biomed Anal, 2018, 159: 153-165.
- [8] U. S. Food and Drug Administration. Guidance for Industry: Bioanalytical Method Validation, <https://www.fda.gov/ucm/groups/fdagov-public/@fdagovdrugs-gen/documents/document/nt/ucm070107.pdf>.
- [9] WANG H P, ZHANG Y B, YANG X W, et al. Rapid characterization of ginsenosides in the roots and rhizomes of *Panax ginseng* by UPLC-DAD-QTOF-MS/MS and simultaneous determination of 19 ginsenosides by HPLC-ESI-MS[J]. J Ginseng Res, 2016, 40: 382-394.
- [10] 杨秀伟, 王洪平, 徐菟, 等. 不同产地人参根和根茎中人参皂苷的含量分析[J]. 药物分析杂志, 2017, 37(1): 30-36.
- [11] YANG X W, MA L Y, ZHOU Q L, et al. SIRT1 activator isolated from artificial gastric juice incubate of total saponins in stems and leaves of *Panax ginseng*[J]. Bioorg Med Chem Lett, 2018, 28: 240-243.
- [12] MA L Y, ZHOU Q L, YANG X W. New SIRT1 activator from alkaline hydrolysate of total saponins in the stems-leaves of *Panax ginseng*[J]. Bioorg Med Chem Lett, 2015, 25: 5321-5325.
- [13] GUI F J, YANG X W, LI L Y, et al. Simultaneous enantiomer determination of 20(R)- and 20(S)-ginsenoside-Rg₂ in rat plasma after intravenous administration using HPLC method[J]. J Chromatogr B, 2007, 850(1/2): 1-6.
- [14] 杨秀伟. 人参化学成分的代谢动力学研究[J]. 中国现代中药, 2016, 18(1): 16-35.
- [15] ZHOU Q L, ZHU D N, YANG Y F, et al. Simultaneous quantification of twenty-one ginsenosides and their three aglycones in rat plasma by a developed UFLC-MS/MS assay: Application to a pharmacokinetic study of red ginseng[J]. J Pharm Biomed Anal, 2017, 137: 1-12.
- [16] LEE S M. Anti-inflammatory effects of ginsenosides Rg₅, Rz₁, and Rk₁: Inhibition of TNF- α -induced NF- κ B, COX-2, and iNOS transcriptional expression[J]. Phytother Res, 2014, 28(12): 1893-1896.
- [17] LIU Y N, FAN D D. Ginsenoside Rg₅ induces apoptosis and autophagy via the inhibition of the PI3K/Akt pathway against breast cancer in a mouse model[J]. Food Funct, 2018, 9(11): 5513-5527.
- [18] QU Y, LIU H Y, GUO X X, et al. Converting ginsenosides from stems and leaves of *Panax notoginseng* by microwave processing and improving their anticoagulant and anticancer activities[J]. Rsc Adv, 2018, 8(70): 40471-40482.
- [19] WANG Z, HU J N, YAN M H, et al. Caspase-mediated anti-apoptotic effect of ginsenoside Rg₅, a main rare ginsenoside, on acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice[J]. J Agric Food Chem, 2017, 65(42): 9226-9236.
- [20] KWAK J H, PYO J S. Characterization of apoptosis induced by ginsenosides in human lung cancer cells[J]. Anal Lett, 2016, 49(6): 843-854.
- [21] ZHOU Q L, YANG X W. Four new ginsenosides from red ginseng with inhibitory activity on melanogenesis in melanoma cells[J]. Bioorg Med Chem Lett, 2015, 25: 3112-3116.
- [22] Tung N H, Song G Y, Minh C V, et al. Steamed ginseng-leaf components enhance cytotoxic effects on human leukemia HL-60 cells[J]. Chem Pharm Bull, 2010, 58(8): 1111-1115.
- [23] 曹满, 余河水, 宋新波, 等. 人参皂苷衍生化及其抗肿瘤构效关系研究进展[J]. 药学学报, 2012, 47(7): 836-843.
- [24] MA L Y, YANG X W. Six new dammarane-type triterpenes from acidic hydrolysate of the stems-leaves of *Panax ginseng* and their inhibitory-activities against three human cancer cell lines[J]. Phytoche Lett, 2015, 13: 406-412.
- [25] LI K K, YANG X B, YANG X W, et al. New triterpenoids from the stems and leaves of *Panax ginseng*[J]. Fitoterapia, 2012, 83(6): 1030-1035.
- [26] LI K K, YAO C M, YANG X W. Four new dammarane-type triterpene saponins from the stems and leaves of *Panax ginseng* and their cytotoxicity on HL-60 cells[J]. Planta Med, 2012, 78(2): 189-192.
- [27] 李珂珂, 杨秀伟. 人参茎叶化学成分的研究进展[J]. 中国现代中药, 2012, 14(1): 47-50.
- [28] ZHANG L, ZHOU Q L, YANG X W. Determination of the transformation of ginsenosides in Ginseng Radix et Rhizoma during decoction with water using ultra-fast liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry[J]. J Sep Sci, 2018, 41: 1039-1049.

(收稿日期: 2018-12-24 编辑: 王笑辉)