· 基础研究 ·

龟甲的特异性 PCR 及高分辨率熔解曲线 技术鉴别方法研究[△]

张雪艳^{1,2}, 袁媛^{1*}, 胡启跳¹, 蒋超^{1*}, 方成武²

1. 中国中医科学院 中药资源中心 道地药材国家重点实验室培育基地, 北京 100700;
2. 安徽中医药大学 药学院, 安徽 合肥 230012

[摘要] 目的: 建立高效、稳定的龟甲 *Testudinis Carapax et Plastrum* DNA 鉴别方法。方法: 利用龟甲的特异性聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction, PCR)鉴别方法和高分辨率熔解曲线(HRM)鉴别方法, 根据龟甲及其混伪品 COI 序列差异, 寻找特异性单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism, SNP)位点设计鉴别引物, 并对 PCR 反应条件进行优化; 并使用通用引物扩增 COI 区域, 产物直接进行 HRM 分析。结果: 当退火温度为 60 °C, 循环次数为 35, 使用设计的龟甲特异性鉴别引物 GJ-360. F/R 进行 PCR 扩增, 经扩增均获得约 360 bp 特异性鉴别条带, 混伪品皆无条带; 使用通用引物 RonM-tl 和 Vl-tl 进行 PCR 扩增, 产物使用 HRM 分析, 龟甲药材在模板 DNA 质量浓度为 3.5 ~ 87.9 ng·μL⁻¹、引物浓度为 0.2 μmol·L⁻¹、镁离子浓度为 2.0 mmol·L⁻¹ 的条件下, 龟甲药材标准熔解曲线为双峰, 其 T_m 均值分别为(83.15 ± 0.76)、(87.53 ± 0.69) °C。结论: 特异性 PCR 和 HRM 均可作为一种快速准确鉴别龟甲正伪品的鉴定方法。

[关键词] 龟甲; 特异性聚合酶链式反应; 分子鉴定; 高分辨率熔解曲线

[中图分类号] R282.74; R284 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-4890(2019)09-1215-06

doi:10.13313/j.issn.1673-4890.20190410002

Identification of *Testudinis Carapax et Plastrum* by Specific PCR Method and High-resolution Melting Analysis

ZHANG Xue-yan^{1,2}, YUAN Yuan^{1*}, HU Qi-tiao¹, JIANG Chao^{1*}, FANG Cheng-wu

1. State Key Laboratory Breeding Base of Dao-di Herbs, China Academy of Chinese Medical Sciences, National Resource Center for Chinese Materia Medica, Beijing 100700, China;
2. Anhui University of Chinese Medicine, Hefei 230012, China

[Abstract] **Objective:** To establish an efficient and stable DNA identification method for *Testudinis Carapax et Plastrum*(TCP). **Methods:** Based on the COI sequence differences between TCP and its adulterants, specific SNP loci were designed and primers were identified by using specific PCR and high-resolution melting curve(HRM)methods, and the conditions of PCR reaction were optimized. The COI region was amplified by universal primers, and the products were analyzed by HRM directly. **Results:** When the annealing temperature was 60 °C and the cycle number was 35, a specific band of 360 bp was visual on the gel electropherogram were using the designed TCP specific primer Gujia. F/R. high-resolution melting curve (HRM)technology was also applied to identification of TCP using COI universal primers. The annealing temperature was 60 °C and cycle number was 40. With chosen appropriate DNA template concentration, and the primer concentration as well as Mg²⁺ concentration, an HRM model was established. The high melting curve of TCP was bimodal melting curve under these conditions, when the DNA template concentration was 3.5 - 87.9 ng·μL⁻¹, the primer concentration was 0.2 μmol·L⁻¹, Mg²⁺ concentration was 2.0 mmol·L⁻¹, the T_m value of HRM curve was(83.15 ± 0.76)and(87.53 ± 0.69), respectively. **Conclusion:** The results show that these two methods could use as rapid and accurate identification method for identify TCP and its adulterants.

[Keywords] *Testudinis Carapax et Plastrum*; specific PCR; molecular identification; High-resolution melting curve

[△] [基金项目] 中央本级重大增减支项目(2060302); 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(ZZ10-008)

* [通信作者] 蒋超, 助理研究员, 研究方向: 中药 DNA 分子鉴定研究; Tel: (010)64087649, E-mail: jiangchao0411@126.com
袁媛, 研究员, 研究方向: 中药鉴定与分子生药学研究; Tel: (010)64087649, E-mail: y_yuan0732@163.com

龟甲是中国的传统名贵药材之一,来源于龟科动物乌龟 *Chinemys reevesii* (Gray) 的背甲及腹甲,具滋阴潜阳、益肾强骨、养血补心、固经止崩之功效^[1]。龟甲在临床上应用广泛,且为细贵中药材,极易混伪,对破碎的、不完整的龟甲也无法进行客观、准确鉴别。龟甲混伪品有近 20 种,包括巴西龟、马来闭壳龟、黄缘闭壳龟、黄喉拟水龟、平胸龟、地龟、四眼斑水龟、印度棱背龟、庙龟、锯缘龟、凹甲陆龟、缅甸陆龟等^[2-6],尤其是巴西龟在龟甲伪品中极为常见。

近年来 DNA 分子鉴别技术快速发展,位点特异性 PCR、DNA 测序等技术开始用于动物类药材的鉴别,多种动物药材已建立分子鉴别方法^[7-11]。刘晓帆等^[12]已使用基于 COI 序列的 DNA 条形码技术鉴定龟甲及其混伪品,邓莹等^[13]根据 Cytb 序列设计特异性引物,使用酚-三氯甲烷法提取 DNA 并建立了龟甲特异性 PCR 鉴别方法。高分辨率熔解曲线技术 (High resolution melting, HRM) 因其具有高通量、低成本、简单快捷、和闭管操作等优点^[14-15],避免了溴化乙锭、聚丙烯酰胺等有害试剂的使用和紫外照射,且有望检出正伪掺杂的样品,在中药 DNA 分子鉴定领域已有应用^[16-19]。

本研究建立了龟甲药材和饮片 DNA 快速提取方法,建立并比较了龟甲特异性 PCR 鉴别方法和高分辨率熔解曲线鉴别方法的优劣,进行了系统的方法学考察,可快速、准确鉴别龟甲及其常见混伪品。

1 材料

1.1 药材

龟甲对照药材购自中国食品药品检定研究院(批号:121494-201604)。样品购自河北安国药材市场、安徽亳州药材市场、广州玉林药材市场、云南昆明药材市场。共获得龟甲与其混伪品 42 批,实验样品经张继教授、李军德教授鉴定,存于中国中医科学院中药资源中心,见表 1。

1.2 试剂

柱式骨骼 DNAout 试剂盒(北京天恩泽公司,批号:91102-50); Ex Taq (Takara 公司,批号:RR001Q); SpeedSTAR HS Taq (Takara 公司,批号:RR070Q); 2 × T5 Super PCR Mix(北京擎科新业生物技术有限公司,批号:TSE005); r Taq DNA (Takara 公司,批号:DR100A); 金牌 Mix Green PCR(北京

表 1 龟甲样品

No.	名称	物种学名	数量	鉴定人
1	龟甲药材	<i>Chinemys reevesii</i>	18	张继
2	龟甲饮片	<i>C. reevesii</i>	6	张继
3	巴西龟	<i>Trachemys scripta</i>	7	张继、李军德
4	马来龟	<i>Malayemys subtrijuga</i>	1	张继
5	拟鳄龟	<i>Chelydra serpentina</i>	2	张继
6	锯缘龟	<i>Pyxidea mouhotii</i>	1	张继
7	缅甸陆龟	<i>Indotestudo elongata</i>	2	李军德
8	平胸龟	<i>Platyu sternon megacephalum</i>	1	李军德
9	黄喉拟水龟	<i>Mauremys mutica</i>	1	李军德
10	中华花龟	<i>Ocadia sinensis</i>	1	李军德
11	黄缘闭壳龟	<i>Cistoclemmys flavomarginata</i>	1	李军德
12	四眼斑水龟	<i>Sacalia quadriocellata</i>	1	李军德

擎科新业生物技术有限公司,批号:TSE101); MightyAmp DNA 聚合酶 (Takara 公司,批号:R071Q); LightCycler480 High Resolution Melting Master (Roche 公司,批号:4909631001); 2000 bp DNA Marker (Takara 公司,批号:3427Q)。

1.3 仪器

Veriti™ 型、GeneAmp 9700 型 (Applied Biosystems 公司); TC-512 型 (Techne 公司); PTC-100 型 (Gene 公司); PCR 仪、LightCycler480 型实时荧光定量 PCR 仪 (Roche 公司); SYNGENE 凝胶成像系统 (GENE 公司)。

2 方法

2.1 DNA 提取

取药材约 50 mg,粉碎成粉末。取粉末 20 mg,置 2 mL 离心管中,使用柱式骨骼 DNA 提取试剂盒提取 DNA,加入 1000 μL 65 °C 预热的提取缓冲液,充分混匀; 65 °C 水浴 30 min; 加入 300 μL 缓冲液及 200 μL 三氯甲烷; 充分混匀, 12 000 r·min⁻¹ 下离心 5 min; 取 500 μL 上清至 1 个新的 1.5 mL 离心管,加入 500 μL 上柱缓冲液,充分混匀; 加入 DNA 纯化柱中, 12 000 r·min⁻¹ 下离心 1 min; 弃穿透液; 加入洗脱液 500 μL, 12 000 r·min⁻¹ 下离心 1 min; 弃穿透液,加入洗脱液 500 μL, 12 000 r·min⁻¹ 下再离心 1 min; 弃穿透液,离心 DNA 纯化柱 2 min; 加入 50 μL 无菌双蒸水,室温放置 2 min 后 12 000 r·min⁻¹ 下离心 1 min,取穿透液稀释 10 倍用于 PCR 反应。

2.2 特异性引物的设计

从 GenBank 查找乌龟及巴西龟、黄喉拟水龟、

拟鳄龟、平胸龟、中华花龟、缅甸陆龟伪品的 COI 序列。用 BioEdit 软件进行序列比对, 找到差异片段, 并设计鉴别引物: GJ-360. F 5'-GCTTTG-GAAACTGACTTGTACCTTTAATG-3' 和 GJ-360. R 5'-GAGAGTAGTAATAGGACGGCTGTAATAAGTTCA-3'。

2.3 龟甲特异性 PCR 鉴别方法

在 200 μL 离心管中进行 PCR 反应。反应总体积为 25 μL , 包括 10 $\times$ PCR 缓冲液 2.5 μL 、dNTP (2.5 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) 1 μL 、鉴别引物 (10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 各 0.4 μL 、*Taq* DNA 聚合酶 (5 $\text{U}\cdot\text{L}^{-1}$) 0.2 μL 和 DNA 模板 1 μL , 用无菌水补足反应体积。PCR 反应程序: 95 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 5 min, 循环反应 35 次 (95 $^{\circ}\text{C}$ 30 s, 60 $^{\circ}\text{C}$ 30 s, 72 $^{\circ}\text{C}$ 30 s), 72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 5 min, 4 $^{\circ}\text{C}$ 保温结束反应。PCR 产物经 1.5% 琼脂糖凝胶电泳, EB 染色, 置于凝胶成像仪上或紫外透射仪上成像。并考察主要参数: PCR 退火温度、PCR 循环次数、DNA 模板用量、DNA 聚合酶种类和 PCR 仪类型对龟甲特异性 PCR 鉴别方法的影响, 获得最优鉴别条件。

2.4 熔解曲线分析

分别以龟甲药材 DNA 为模板, 调整 DNA 浓度在合适范围内, 在 Light Cycler 480 型实时荧光定量 PCR 仪上进行 PCR 扩增, 而后直接进行熔解曲线分析。PCR 反应总体积 20 μL , PCR 反应体系: 2 $\times$ High Resolution Melting Master Mix 10 μL 、 MgCl_2 (25 $\text{mmol}\cdot\text{L}^{-1}$) 1.6 μL 、COI 通用引物序列 RonM-tl 5'-TGTAAGAGGAGGGCCAGTGGMCCMGATATRGCATTTCCC-3'; VRL-tl 5'-CAGGAAACAGCTATGACTAGACTTCTGGGTGGCCAAAGAATCA-3'。引物 (10 $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) 各 0.4 μL 、模板 DNA 1 μL 、加 ddH₂O 补齐到 20 μL 。反应程序为: 95 $^{\circ}\text{C}$ 预变性 10 min, 95 $^{\circ}\text{C}$ 变性 30 s、60 $^{\circ}\text{C}$ 退火 30 s、72 $^{\circ}\text{C}$ 延伸 45 s, 40 循环; 而后进入高分辨熔解曲线分析程序: 95 $^{\circ}\text{C}$ 1 min, 40 $^{\circ}\text{C}$ 1 min, 66 $^{\circ}\text{C}$ 1 s; 40 $^{\circ}\text{C}$ 冷却 10 s, 每秒采集 25 个数据, 获得龟甲及其混伪品的熔解曲线。

2.5 熔解曲线模型的建立

随机选取 3 批龟甲药材, 使用 COI 通用引物进行 PCR 扩增和熔解曲线分析; 利用罗氏 Lightcycler 480 Software 1.5 软件建立龟类熔解曲线模型, 对其精密度、重复性进行考察。

2.6 PCR 反应体系适用性分析

考察模板 DNA 用量、引物浓度、镁离子浓度对熔解曲线峰形和 T_m 值的影响, 从而确定可依据峰形和 T_m 值鉴别龟甲药材真伪的适合条件。

3 结果与分析

3.1 龟甲的特异性 PCR 鉴别方法条件确定

使用设计的龟甲特异性鉴别引物进行 PCR 扩增, 并依次考察 PCR 鉴别体系和鉴别条件关键因素对龟甲特异性 PCR 鉴别方法的影响, 以获得最优鉴别条件。当退火温度设定为 58、60、62 $^{\circ}\text{C}$, 结果表明, 在 58 ~ 60 $^{\circ}\text{C}$ 时, 龟甲正品均能扩增得到 360 bp 的条带, 混伪品缅甸陆龟、黄缘拟水龟、中华花龟、四眼斑水龟、巴西龟等均无条带, 使用相同方法依次对 PCR 循环次数、模板 DNA 用量、*Taq* 酶种类和 PCR 仪型号进行考察, 当退火温度为 60 $^{\circ}\text{C}$, PCR 循环次数为 30 个循环, 模板 DNA 浓度为 20 $\text{ng}\cdot\mu\text{L}^{-1}$, 使用无 5'-3' 的 *Taq* DNA 聚合酶进行扩增时获得最优鉴别结果, 龟甲正品均扩增获得 360 bp 特异性鉴别条带, 混伪品无条带。其中 *Taq* 酶种类和模板 DNA 用量对鉴别结果有较大影响, 高保真 DNA 聚合酶扩增保真率虽高, 但效率低, 产物获得率低, 易出现假阴性结果。模板 DNA 用量过高 (100 ng) 易出现假阳性鉴别结果, 混伪品均可出现假阳性条带, 见表 2。

3.2 龟甲特异性 PCR 鉴别方法的适用性考察

采用 3.1 确定的特异性 PCR 鉴别体系, 对 24 批龟甲样品及 18 批伪品进行鉴别 (见图 1 ~ 2), 结果表明, 该体系能稳定、准确地鉴别龟甲药材和饮片。

注: M. DL2000 Marker; P. 阳性对照; N. 空白对照 (dd H₂O 为模板); 1~3. 龟甲; 4. 巴西龟; 5. 马来龟; 6. 拟鳄龟; 7. 锯缘龟; 8. 缅甸陆龟; 9. 平胸龟; 10. 黄缘拟水龟; 11. 中华花龟; 12. 黄缘闭壳龟; 13. 四眼斑水龟; 14. 安南龟。

图 1 龟甲正伪品鉴别结果

表2 龟甲特异性 PCR 鉴别条件考察结果

项目	参数				
	退火温度/°C	PCR 循环次数	模板 DNA/ng	Taq 酶种类	PCR 仪型号
参数值	58、60、62	25、30、35、40	100、20、4	RTaq、Ex Taq、pfu Taq	ABI 9700、Veriti、PTC-100
适宜范围	58~62	30~40	4~20	均可使用	均可使用
最优条件	60	35	20	rTaq	ABI 9700

注：M. DL2000 Marker；P. 阳性对照；N. 空白对照 (dd H₂O 为模板)；1~6. 不同市场来源龟甲药材；7~9. 龟甲饮片。

图2 不同批次龟甲特异性 PCR 鉴别结果

3.3 龟甲的高分辨率熔解曲线鉴别方法的建立

3.3.1 熔解曲线模型的建立 使用高分辨率熔解曲线技术对龟甲进行鉴别，建立其熔解曲线模型。随机选择不同来源的龟甲药材3批，分别提取其DNA，使用COI通用引物进行PCR扩增，并进行熔解曲线分析，结果表明，龟甲熔解曲线为双峰，其T_m值分别为(83.15 ± 0.76)、(87.53 ± 0.69)°C，RSD分别为0.91%、0.80%。对同一批龟甲DNA样品，进行熔解曲线分析，重复3次，其熔解曲线峰形一致，RSD值在分别在0.30%~0.80%、0.20%~0.80% (见图3)。

注：A. 3批龟甲药材熔解曲线；B. 龟甲COI熔解曲线参考模型。

图3 龟甲药材熔解曲线模型的建立

3.3.2 高分辨率熔解曲线技术鉴别反应体系适用性分析 选取龟甲DNA，测定其浓度，并依次稀释为87.9、25.0、3.5、0.7 ng·μL⁻¹，以COI作为引物进行扩增，获得熔解曲线，并分析不同浓度模板DNA对龟甲熔解曲线峰形和T_m值的影响。结果表明，模板DNA在3.5~87.9 ng·μL⁻¹均获得较为均一的熔解曲线，可用于龟甲药材分子鉴别(见图4A)。

注：A. 不同浓度模板DNA对龟甲熔解曲线峰形和T_m值的影响；B. 不同引物浓度对龟甲熔解曲线峰形和T_m值的影响；C. 不同浓度MgCl₂对龟甲熔解曲线峰形的影响。

图4 龟甲高分辨率熔解曲线鉴别条件考察结果

依据 Light Cycler 480 High Resolution Melting Master 说明书中引物最适浓度为 $0.1 \sim 0.3 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 在 $20 \mu\text{L}$ 反应体系中分别加入 0.2 、 0.4 、 0.6 、 $0.8 \mu\text{L}$ 引物(母液浓度为 $10 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$), 获得其熔解曲线, 并分析不同引物浓度对龟甲熔解曲线峰形和 T_m 值的影响。结果表明, 引物为 $0.2 \mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时可形成稳定的熔解曲线峰形(见图 4B)。

在 $20 \mu\text{L}$ 反应体系中分别加入 1.5 、 2.0 、 2.5 、 $3.0 \mu\text{L}$ 的 MgCl_2 溶液(母液浓度为 $25 \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$), 获得其熔解曲线, 并分析不同引物浓度对龟甲熔解曲线峰形和 T_m 值的影响。结果表明, 引物浓度为 $2.0 \text{mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ 时可形成稳定的熔解曲线峰形(见图 4C)。

3.3.3 高分辨率熔解曲线技术鉴别龟甲正伪品 选取 4 种常见龟甲伪品巴西龟、马来龟、拟鳄龟、黄喉拟水龟, 分别提取其总 DNA, 进行熔解曲线分析, 获得伪品熔解曲线。对龟甲及其伪品熔解曲线进行比较, 结果表明, 龟甲混伪品 HRM 曲线均与正品有显著差异, 可以相互区分(见图 5)。

图 5 使用高分辨率熔解曲线技术鉴别龟甲正品及其混伪品(以巴西龟为例)

4 讨论

PCR 鉴别准确性取决于 DNA 提取质量。动物药材来源广泛, 其中, 部分动物药材来自于甲壳、皮肤、分泌物、角质物等。由于这些药材在市场上流通时间长、加之高温等因素, 使得药材 DNA 严重降解, 从而给 DNA 提取造成麻烦。此外, *Taq* 酶种类和模板 DNA 的用量也会对鉴别结果有较大影响, 高保真 DNA 聚合酶扩增保真率虽高, 但效率低, 产物获得率低, 易出现假阴性结果。模板 DNA 用量过高 (100ng) 易出现假阳性鉴别结果, 混伪品均可出现假阳性条带。另外, 笔者对比了十二烷基硫酸钠法 (SDS)、十六烷基三甲基溴化铵法 (CTAB)、高盐低

pH 法及 3 种不同的柱式 DNA 提取试剂盒对龟甲 DNA 提取的效果, 发现在不进行脱钙的情况下, 仅柱式骨骼 DNA 提取试剂盒对龟甲药材和蒸制饮片具有较好的提取效果, 基于硅胶膜离心柱的方法相对于其他方法操作更为简单, 易于标准化, 且在角、甲类动物药材上具有良好的提取效果, 已用于羚羊角、鹿角等动物药材的 DNA 提取^[20-21], 有望拓展到其他角、甲类药材的提取。

本文建立了快速简便的龟甲 DNA 提取和 DNA 鉴定方法, 使用特异性 PCR 鉴别可在 4 h 内获得鉴定结果, 该方法既可用于龟甲药材亦可用于龟甲饮片, 有助于龟甲的质量控制, 提高龟甲质量标准。同时本文也建立了龟甲的高分辨率熔解曲线技术鉴别方法, 使用 HRM 鉴别可在 3 h 内获得鉴别结果, 且 HRM 可替代凝胶电泳对 PCR 产物及其酶切片段进行检测, 避免使用溴化乙锭、聚丙烯酰胺等有害试剂和紫外照射。然而, 在对龟甲饮片进行扩增时发现, 无论是使用通用引物 L1490/H2198 或引物 RonM-tl/VRL-tl 均无法扩出条带, 推测是龟甲饮片经高温水煮后 DNA 严重降解, 难以扩增获得 400 bp 以上的条带, 表明直接使用通用引物结合 HRM 的方法无法鉴别龟甲饮片, 下一步可考虑针对龟甲及其混伪品的序列差异, 根据 SNP 位点设计引物, 建立特异性的 HRM 鉴别方法^[22-23]。

参考文献

- [1] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典:一部[M]. 北京:中国医药科技出版社,2015:180.
- [2] 李悦,王淑芬. 龟甲的真伪鉴别[J]. 中草药,2000,31(11):68-69.
- [3] 姚腊初. 平胸龟甲的动物来源与药材鉴别研究[J]. 卫生职业教育,2004,22(13):6.
- [4] 金朝阳,陈政威. 龟甲及其 10 种混淆品的性状鉴别[J]. 时珍国医国药,2002,13(4):225.
- [5] 刘中权,王义权,周开亚,等. 中药材龟甲及原动物的高特异性 PCR 鉴定研究[J]. 药学学报,1999,34(12):941-945.
- [6] 吴平,周开亚,徐珞珊,等. 中药材龟甲的分子鉴定研究[J]. 药学学报,1998,33(4):65-70.
- [7] 刘富艳,金艳,袁媛,等. 基于形态和 DNA 序列分析的海龙类药材商品的基原调查[J]. 世界中医药,2018,13(2):241-247.
- [8] 何志一,唐先明,刘建辉,等. 快速 PCR 方法在哈蟆油真

- 伪鉴别中的应用研究[J]. 中国中药杂志, 2017, 42(13): 2467-2472.
- [9] 刘旭朝, 周丽思, 刘金欣, 等. 基于 COI 序列的水牛角及其易混伪品 DNA 条形码鉴定研究[J]. 药学学报, 2017, 52(3): 494-499.
- [10] 黄璐琦, 袁媛, 蒋超, 等. 动物药材分子鉴别现状与策略[J]. 中国现代中药, 2017, 19(1): 1-10.
- [11] 陈康, 蒋超, 袁媛, 等. 快速 PCR 方法在蛇类药材真伪鉴别中的应用[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(19): 3673-3677.
- [12] 刘晓帆, 刘春生, 杨瑶琿, 等. 基于 COI 基因的龟甲及其混伪品的 DNA 条形码研究[J]. 中国中药杂志, 2013, 38(7): 947-950.
- [13] 邓莹, 李明成, 张丽华. 复合聚合酶链反应鉴别龟甲正品与伪品的特征[J]. 中国药学杂志, 2014, 49(12): 1022-1026.
- [14] 陈康, 蒋超, 袁媛, 等. 高分辨率熔解曲线技术及其在中药 DNA 分子鉴定中的应用[J]. 药学学报, 2015, 50(12): 1581-1588.
- [15] 陈斌, 雷秀霞, 周小棉. 高分辨率熔解曲线技术及其在分子诊断中的应用进展[J]. 分子诊断与治疗杂志, 2009, 1(2): 120-124.
- [16] 过立农, 刘杰, 赵春艳, 等. 基于 DNA 条形码和高分辨率熔解曲线技术快速鉴别肉苁蓉[J]. 药物分析杂志, 2018, 38(4): 665-671.
- [17] 张梦婷, 孙伟, 师玉华, 等. 基于 HRM 的常见伞形科香辛料快速鉴定[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(6): 26-31.
- [18] 陈康, 蒋超, 金艳, 等. 人参属中药材高分辨率熔解曲线鉴定及其方法学考察[J]. 药物分析杂志, 2017, 37(1): 64-73.
- [19] 孙伟, 熊超, 李景剑, 等. 高分辨率熔解曲线技术在多基原药材升麻鉴定中的应用[J]. 药学学报, 2016, 51(10): 1638-1642.
- [20] JIANG C, JIN Y, ZHAO X, et al. Rapid and robust authentication of deer antler velvet product by fast PCR-RFLP analysis[J]. Mitochondrial DNA A, 2018, 29(2): 266-272
- [21] YAN D, LUO J Y, HAN Y M, et al. Forensic DNA barcoding and bio-response studies of animal horn products used in traditional medicine[J]. PloS one, 2013, 8(2): e55854.
- [22] REED G H, WITWER C T. Sensitivity and specificity of single-nucleotide polymorphism scanning by high-resolution melting analysis [J]. Clin Chem, 2004, 50(10): 1748-1754.
- [23] DONG X, JIANG C, YUAN Y, et al. Application of high-resolution melting analysis for authenticity testing of valuable Dendrobium commercial products [J]. J Sci Food Agri, 2018, 98(2): 549-558.

(收稿日期: 2019-04-10 编辑: 王笑辉)